



ПЕРОРАЛЬНА ІМУНІЗАЦІЯ ДИКИХ М'ЯСОЇДНИХ ТВАРИН ВІД СКАЗУ

Пероральна імунація

здійснюється шляхом
**розповсюдження
принад із вакциною**

- вручну
- авіатранспортом

У зв'язку з воєнним станом
проводиться лише
наземний розподіл



у погодженні з
військовими
адміністраціями

До складу груп входять

- спеціалісти територіальних управлінь Держпродспоживслужби
- спеціалісти органів місцевого самоврядування
- фахівці лісового та мисливського господарств
- користувачі мисливських угідь

Відповідно до
Протипізоотичного плану на 2023 р.



- на узліссях
- на узбіччі доріг
- біля річок
- на сільськогосподарських угіддях
- у лісах
- на перехрестях доріг
- на території вирубок

Вакцина




- **сприяє** створенню імунітету
- **не викликає** захворювання у молодих тварин
- **не сприяє** виділенню вакцинного вірусу зі слиною
- **безпечна** для інших тварин
- **безпечна** для людини та природного середовища
- **стабільна** в польових умовах

Принада

має вигляд невеликих брикетів із запахом м'ясо-кісткового борошна

капсула з вакциною



У разі виявлення подібних принад –
не беріть їх руками і не переносьте
з місць розкладання, щоб тварини
змогли їх знайти



Ефективність методу доведена світовим та європейським досвідом,
а також результатами, що були отримані в Україні
після проведення зазначених заходів

Сказ домашнього улюбленця можна попередити. ЩОРІЧНА вакцинація – рятує життя!



Публікацію підготовлено за фінансової підтримки Європейського Союзу. Її зміст є виключною відповідальністю Державної служби України з питань безпеки харчових продуктів та захисту споживачів і не обов'язково відображає позицію Європейського Союзу